


Teststrategie voor hoog risico contacten na contact op of buiten het werk



1. geen symptomen of geen symptomen die PCR vereisen (*) : Ag sneltest uitvoeren zo snel mogelijk na laatste contact met het bevestigd geval

➕ : min 7 d isolatie

- : blijven werken

→ *op het werk* : verscherpte hygiënische maatregelen (1,5 m afstand, steeds masker dragen, max. contacten vermijden, handhygiëne)

→ *buiten het werk* : quarantaine, geen sociale contacten, zelf monitoring en huisarts contacteren bij symptomen

→ Ag sneltest herhalen na 3 d (**) indien ➕ : min 7 d isolatie

- : blijven werken, verscherpte hygiënische maatregelen op en buiten het werk (zie hoger)

→ PCR op D7 ➕ : min 7 d isolatie

- : nog 7 d algemene maatregelen (***)

2. symptomen overeenstemmend met 'mogelijk geval' : onmiddellijk PCR of Ag test en onmiddellijke quarantaine

Ag test of PCR ➕ : min 7 d isolatie

Ag test of PCR - : quarantaine verderzetten en PCR test herhalen op D7 PCR ➕ : min 7 d isolatie

PCR - : stop quarantaine

nog 7 d algemene maatregelen (***)

(*) symptomen overeenstemmend met 'mogelijk geval': zie 'Gevalsdefinitie' van Sciensano

(**) alleen indien 1^e Ag test snel na laatste contact met bevestigd geval wordt uitgevoerd; indien niet: geen 2^e Ag test, wel PCR-test op D7 - versie 10/12/20

(***) zie Sciensano : 'Maatregelen voor contacten' / nauwe contacten'